



Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Marche  
Azienda Ospedaliera  
**Ospedali Riuniti Marche Nord**  
Presidio Ospedaliero Santa Croce  
Via Vittorio Veneto, 2 - 61032 Fano  
**OTORINOLARINGOIATRIA**

**Direttore**  
Dr. Giuseppe Migliori

Segreteria Fano 0721 882853  
Segreteria Pesaro 0721/362269

giuseppe.migliori  
@ospedalimarchenord.it

## INFORMAZIONI PER I PAZIENTI OPERATI DI POLIPOSIS NASALE

Dopo l'intervento chirurgico la fase di riepitelizzazione e di cicatrizzazione della mucosa nasale dura dalle tre alle sei settimane.

In questo periodo è molto facile che la mucosa subisca un marcato rigonfiamento e che nel naso si accumulino secrezioni dense e croste. E' quindi possibile che in alcune situazioni, dopo l'intervento, per un periodo di tempo variabile da paziente a paziente, la respirazione rinogena possa peggiorare.

Non è mai possibile assicurare un recupero dell'olfatto, specie nei pazienti già operati; il recupero, quando avviene, è generalmente progressivo e tardivo.

La terapia domiciliare e i primi controlli post operatori hanno lo scopo di rimuovere dalle fosse nasali le croste e le secrezioni al fine di favorire un regolare processo di riepitelizzazione della mucosa, evitando la possibilità di infezioni e di anomale cicatrizzazioni denominate sinechie.

*E' indispensabile che il paziente torni anticipativamente al controllo se comparissero:*

- ❖ sanguinamento importante;
- ❖ secrezione nasale dolciastra (generalmente da una sola narice o chinando in avanti la testa);
- ❖ gonfiore intorno ad uno o entrambi gli occhi che si accentua soffiando il naso;
- ❖ alterazioni visive: calo repentino della vista o diplopia (visione doppia);
- ❖ febbre elevata (>38,5-39°C) specie se associata a disturbi di coscienza.

*Normalmente il paziente operato può presentare:*

- ❖ secrezioni nel naso e nella gola con possibili striature di sangue;
- ❖ secrezione nasale densa con facile tendenza alla formazione di croste in genere di colore scuro;

- ❖ *difficoltà respiratoria nasale per la presenza di formazioni croste;*
- ❖ *dolorabilità all'arcata dentaria superiore o ai lati del naso;*
- ❖ *lieve rialzo febbrile (fino a 38-38,5°C) nei primi 2-3 giorni successivi all'intervento*

**REGIONE MARCHE**  
**AZIENDA OSPEDALIERA**  
**“OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”**  
**U.O.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA**  
Direttore: Dott. Giuseppe Migliori

## **INFORMAZIONI PER I PAZIENTI OPERATI DI POLIPOSÌ NASALE e/o SINUSITE CRONICA**

Successivamente allo stamponamento si prega di effettuare quotidianamente e nell'ordine la seguente terapia:

- 1. Olio gomenolato: 3-4 gocce per narice 3 volte die per 14 giorni;**
- 2. Lavaggi nasali con soluzione fisiologica: 2-3 volte die per 30 giorni;**
- 3. Rinotricina gtt: 3-4 gocce per narice per 3 volte die per 7 giorni.**

Grazie per la vostra attenzione