



Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord  
**Servizio di Farmacia Ospedaliera**  
Direttore: Dr. Stefano Bianchi

## TARCEVA

### Informativa per i pazienti sull'uso del farmaco

**PRINCIPIO ATTIVO:** erlotinib

**FORMA FARMACEUTICA:** compresse rivestite con film

**MODO D'ASSUNZIONE:** La dose giornaliera raccomandata di Tarceva deve essere assunta a stomaco vuoto, almeno un'ora prima o due ore dopo i pasti. La compressa va assunta intera con un po' d'acqua.

I pazienti che non sono in grado di deglutire la compressa intera possono scioglierla in un bicchiere d'acqua e bere la dispersione così ottenuta. Per assicurarsi che tutta la dose sia assunta, si raccomanda di risciacquare il bicchiere con un altro po' d'acqua e bere anche questa.

Se si dimentica di assumere una dose, la prenda non appena se ne ricorda, a meno che questo non avvenga a distanza ravvicinata dalla dose successiva: in questo caso non assumere la dose dimenticata e continuare con il normale ritmo posologico. Si raccomanda di non assumere mai due dosi contemporaneamente.

Le compresse contengono lattosio e non devono essere somministrate ai pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit di lattasi o da malassorbimento di glucosio-galattosio

**MANIPOLAZIONE:** Accertato che il rivestimento esterno della compressa è intatto, non ci sono rischi nel maneggiare Tarceva compresse.

Chieda al suo farmacista come smaltire il medicinale non utilizzato.

#### **INTERAZIONI:**

**CON FARMACI:** Durante il trattamento con Tarceva è sconsigliata l'assunzione dei seguenti farmaci:  
**ANTIACIDI:** possono ridurre la concentrazione di erlotinib nel sangue. Si consiglia di assumere Tarceva a diverse ore di distanza dall'antiacido per ridurre al minimo il rischio di interazione.

**OMEPRAZOLO, PANTOPRAZOLO, ESOMEPRAZOLO:** possono ridurre l'assorbimento di erlotinib.

**RANITIDINA:** può ridurre l'assorbimento di erlotinib.

**KETOCONAZOLO:** può aumentare l'esposizione a erlotinib.

**WARFARIN:** può aumentare il rischio di sanguinamento.

**RIFAMPICINA:** può ridurre l'efficacia di erlotinib

**CIPROFLOXACINA:** può aumentare l'esposizione a erlotinib.

**IPERICO:** può ridurre la concentrazione di erlotinib nel sangue.

**CON CIBO:** evitare di mangiare il pompelmo o di berne il succo poiché possono aumentare l'esposizione a erlotinib.

**CONSERVAZIONE:** conservare Tarceva a temperatura ambiente e in luogo asciutto, all'interno della confezione originale.



Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord  
**Servizio di Farmacia Ospedaliera**  
Direttore: Dr. Stefano Bianchi

## TASIGNA

### Informativa per i pazienti sull'uso del farmaco

**PRINCIPIO ATTIVO:** nilotinib cloridrato monoidrato

**FORMA FARMACEUTICA:** capsule rigide

**MODO D'ASSUNZIONE:** Tasigna deve essere assunto due volte al giorno, a distanza di circa 12 ore, a stomaco vuoto, senza assumere cibo nelle due ore precedenti o nell'ora successiva la somministrazione.

Le capsule devono essere inghiottite intere con un bicchiere pieno d'acqua. Per i pazienti che non riescono a deglutirle, il contenuto di ogni capsula può essere disperso in un cucchiaino da tè di passata di mela (purea di mela) e deve essere assunto immediatamente. Non deve essere utilizzato più di un cucchiaino da tè di passata di mela e nessun altro cibo oltre a questo.

In caso di vomito o se si dimentica di assumere Tasigna, non reintegri la dose ma continui con il normale ritmo posologico. Si raccomanda di non assumere mai due dosi contemporaneamente. Se ha dei dubbi, non esiti a contattare il suo medico.

Le compresse contengono lattosio quindi non sono adatte per i soggetti con deficit di lattasi, galattosemia o sindrome da malassorbimento di glucosio/galattosio.

**MANIPOLAZIONE:** Accertato che il rivestimento esterno della capsula è intatto, non ci sono rischi nel maneggiare Tasigna. In ogni caso si raccomanda alle donne in gravidanza di non manipolare questo medicinale.

È opportuno lavarsi bene le mani dopo aver toccato il farmaco.

#### **INTERAZIONI:**

**CON FARMACI:** Durante il trattamento con far è sconsigliata l'assunzione dei seguenti farmaci:

- **ANTIBIOTICI:** RIFAMPICINA riduce in modo significativo l'esposizione a nilotinib con rischio di fallimento terapeutico, mentre ERITROMICINA e CLARITROMICINA aumentano la concentrazione del principio attivo nel sangue.

- **ANTIMICOTICI (KETOCONAZOLO, ITRACONAZOLO, VORICONAZOLO):** possono aumentare la concentrazione di nilotinib nel sangue.

- **IPERICO:** può ridurre in modo significativo l'esposizione a nilotinib.

- **FENITOINA e CARBAMAZEPINA:** riducono significativamente l'esposizione a lapatinib.

- **MIDAZOLAM:** l'uso concomitante può aumentare l'esposizione a midazolam.

**CON CIBO:** Evitare di bere il succo di pompelmo poiché può aumentare la concentrazione di nilotinib nel sangue.

**CONSERVAZIONE:** Conservare a temperatura inferiore ai 30 °C, nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.