



Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord
Servizio di Farmacia Ospedaliera
Direttore: Dr. Stefano Bianchi

VOTRIENT

Informativa per i pazienti sull'uso del farmaco

PRINCIPIO ATTIVO: pazopanib cloridrato

FORMA FARMACEUTICA: compresse rivestite con film

MODO D'ASSUNZIONE: La dose prescritta di Votrient deve essere assunta con un bicchiere d'acqua, a stomaco vuoto, almeno un'ora prima o due ore dopo un pasto. Le compresse vanno inghiottite intere e non devono essere masticate, spezzate o frantumate. In caso di vomito dopo la somministrazione di Votrient, non assumere una dose supplementare del medicinale ma continuare il trattamento come al solito. Se si dimentica di assumere una dose, la prenda appena se ne ricorda. Se ciò avviene a meno di 12 ore dalla dose successiva non assumere la dose dimenticata e continuare con il normale ritmo posologico. Si raccomanda di non assumere mai due dosi contemporaneamente. In caso abbia dei dubbi, non esiti a contattare il suo medico.

MANIPOLAZIONE: Accertato che il rivestimento esterno della compressa è intatto, non ci sono rischi nel maneggiare Votrient. In ogni caso si raccomanda alle donne in gravidanza di non manipolare questo medicinale.

È opportuno lavarsi bene le mani dopo aver toccato il farmaco.

INTERAZIONI:

CON FARMACI: Durante il trattamento con Votrient è sconsigliata l'assunzione dei seguenti farmaci:

- **ANTIBIOTICI:** RIFAMPICINA riduce in modo significativo l'esposizione a pazopanib con rischio di fallimento terapeutico, mentre ERITROMICINA e CLARITROMICINA aumentano la concentrazione del principio attivo nel sangue.
- **ANTIMICOTICI (KETOCONAZOLO, POSACONAZOLO, VORICONAZOLO):** possono aumentare la concentrazione di pazopanib nel sangue.
- **INIBITORI DI POMPA PROTONICA (OMEPRAZOLO, ESOMEPRAZOLO, LANSOPRAZOLO, PANTOPRAZOLO):** possono ridurre la concentrazione di pazopanib nel sangue.
- **IPERICO:** può ridurre in modo significativo l'esposizione a pazopanib.
- **FENITOINA e CARBAMAZEPINA:** riducono significativamente l'esposizione a pazopanib.
- **SIMVASTATINA:** l'uso concomitante può aumentare i valori dell'enzima ALT.
- **PACLITAXEL:** l'uso concomitante può aumentare la concentrazione di paclitaxel nel sangue.
- **LAPATINIB:** può aumentare la concentrazione di pazopanib nel sangue.

CON CIBO: nessuna interazione.

CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura ambiente e nella confezione originale, per proteggere il medicinale dall'umidità



Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord
Servizio di Farmacia Ospedaliera
Direttore: Dr. Stefano Bianchi

ZYTIGA

Informativa per i pazienti sull'uso del farmaco

PRINCIPIO ATTIVO: abiraterone acetato

FORMA FARMACEUTICA: compresse

MODO D'ASSUNZIONE: La dose raccomandata di Zytiga è di 1000 mg (4 compresse da 250 mg) da assumere una volta al giorno a digiuno, preferibilmente sempre alla stessa ora. Zytiga deve essere assunto almeno due ore dopo il pasto e nell'ora successiva alla somministrazione non può essere ingerito cibo.

Le compresse vanno deglutite intere con un bicchiere d'acqua e non devono essere masticate, schiacciate o frantumate.

Se si dimentica di assumere una dose, la salti semplicemente e continui con il normale ritmo posologico. Se si dimenticano due dosi consecutive, chiami il suo medico per sapere cosa fare. Si raccomanda di non assumere mai due dosi contemporaneamente.

Le compresse contengono lattosio quindi non sono adatte per i soggetti con deficit di lattasi, intolleranza al galattosio o sindrome da malassorbimento di glucosio/galattosio. Inoltre questo medicinale contiene 0,272 mg di sodio per una dose di quattro compresse: questo aspetto deve essere preso in considerazione per i pazienti che seguono una dieta a ridotto apporto sodico.

MANIPOLAZIONE: Le donne in gravidanza o in età fertile non devono manipolare Zytiga senza usare una protezione, ad esempio guanti monouso

Il paziente, invece, deve lavarsi bene le mani dopo avere toccato il farmaco.

INTERAZIONI:

CON FARMACI: Durante il trattamento con Zytiga è sconsigliata l'assunzione dei seguenti farmaci:

- **RIFAMPICINA, RIFAMICINA e RIFABUTINA:** possono ridurre la concentrazione di abiraterone nel sangue.
- **FENITOINA e CARBAMAZEPINA:** possono diminuire l'esposizione a abiraterone.
- **IPERICO:** può ridurre l'esposizione a abiraterone.
- **PIRFENIDONE:** l'uso concomitante può aumentare l'esposizione a pirlfenidone.
- **LURASIDONE:** l'uso concomitante può aumentare l'esposizione a lurasidone.
- **DESTROMETORFANO:** l'uso concomitante può aumentare la concentrazione di destrometorfano nel sangue.
- **PIOGLITAZONE:** l'uso concomitante può aumentare l'esposizione a pioglitazone.

CON CIBO: Zytiga non deve essere assunto con il cibo.

CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura inferiore a 30 °C e nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.