

|   |  |  |                 |
|---|--|--|-----------------|
|  | <b>Nota informativa</b><br><br><b>Intervento di</b><br><b>Fimosi</b> | ALL08_IOuroIT001_SIC                                     | Pag 1 di 1      |
|   |  | Verifica Dr E Berselli<br>RAQ                            | Rev 00          |
|   |  | Approvazione<br>Dr V. Beatrici<br>Direttore UOC Urologia | Del<br>22.01.19 |

## DEFINIZIONE

La fimosi è la condizione in cui la pelle del prepuzio non si retrae sotto il glande, per cause congenite o acquisite; di solito coesiste anche la brevità del frenulo.

## DESCRIZIONE DELLA TECNICA

L'intervento di plastica prepuziale si esegue in anestesia locale nell'adulto ed in anestesia generale nel bambino. Consiste in una incisione circolare del prepuzio asportandone la parte più stretta e suturandone i bordi; parimenti si seziona il frenulo suturandolo in modo da allungarlo.

Se è presente solo la brevità del frenulo si pratica solo la frenulotomia.

La dimissione avviene comunque in giornata.

## COMPLICANZE

La complicanza più comune è il sanguinamento post-operatorio, risolvibile nel post-operatorio di solito con una semplice compressione; più rara è l'infezione. In qualche caso può in seguito recidivare in fimosi causata dall'eccessiva cicatrizzazione.

Se è presente solo la brevità del frenulo si pratica solo la frenulotomia.