

	<b>Nota informativa</b>  <b>Intervento di Meatotomia uretrale nell'uomo</b>	ALL12_IOuroIT001_SIC	Pag 1 di 1
		Verifica Dr E Berselli RAQ	Rev 00
		Approvazione Dr V. Beatrici Direttore UOC Urologia	Del 22.01.19

## DEFINIZIONE

Consiste nella incisione della parte ventrale del glande, con successivo accostamento dei margini mucosi dell'uretra, per meglio controllare possibili fatti emorragici.

**Indicazioni:** è un procedimento volto alla soluzione di una stenosi del meato uretrale esterno che può essere congenita (ed associarsi ad altre malformazioni congenite, come l'ipospadia) oppure secondaria a fenomeni flogistici locali, specifici o aspecifici, o a traumi, come il cateterismo o il ricorso a strumentazione uretrale endoscopica.

## DESCRIZIONE DELLA TECNICA

Con lama da bisturi si incide il margine ventrale del meato uretrale esterno, procedendo prossimalmente nell'uretra glandulare fino a "guadagnare" il punto in cui il lume di questa riacquista un calibro regolare.

Tipo di anestesia: può bastare un'infiltrazione locale con anestetico, associandola, per la necessità di calibrare poi l'uretra distale, all'introduzione nel lume uretrale di gel anestetico.

Durata dell'intervento è di pochi minuti.

## COMPLICANZE

La recidiva, frequente nella Balanite Xerotica Obliterans.

## RISULTATI

Soddisfacenti dal punto di vista funzionale, non altrettanto da punto di vista estetico. Fa eccezione la stenosi del meato secondaria a Balanite Xerotica Obliterans: in questo caso la tendenza alla recidiva è elevata, per la caratteristica della malattia che colpisce sia il glande, che il prepuzio e la fossa navicolare;

Vantaggi intervento semplice.

Svantaggi dal punto di vista funzionale può essere condizionante il mito a "bagnafiore" che così si realizza.

**Attenzioni da porre alla dimissione:** può essere utile nella prevenzione delle recidive tenere separati i bordi dell'incisione e lubrificare la parte mediante la punta di un tubo per pomate antibiotiche, da utilizzare almeno piu' volte al giorno per 7-10 giorni.

**Controlli:** Valutazioni periodiche della pervietà del lume uretrale (uroflussimetria, calibratura uretrale di necessità).